

HUMBLENKIND

7HO12993

HO840003130915852

COOKIECUTTER HUMBLENKIND-ET TR TP TC TY TV TL TD HH1T HH2T HH3T HH4T HH5T HH6T

MODESTY X EPIC X MAN-O-MAN

Pai: BACON-HILL PETY MODESTY-ET

Mãe: COOKIECUTTER EPIC HAZEL-ET EX-92

5-10 3X 350D 17273 kgM 4,3% 742 kgF 3,4% 582 kgP

Avô materno: GENERVATIONS EPIC

Nascimento: May 30, 2016

Beta caseína: A2A2

K caseína: BB

CED: 9,3%

aAa: 234



Média das Filhas:

13230 kgM 533 kgF 4.00%F 423 kgP 3.20%P



Ladys-Manor Humkind Keisha



Cookiecutter Hendhum-ET



Penn-England Barb 15164-ET

INDÍCES

| | |
|------------------------------------|------|
| TPI | 2444 |
| NM\$ | 343 |
| CM\$ | 344 |
| Índice de Eficiência Alimentar | 49 |
| Feed Saved | -60 |
| HHP\$ | 411 |
| Índice de Saúde e Produção (ISP\$) | 270 |
| Índice de Saúde (IS\$) | 43 |
| CW\$ | -36 |

FERTILIDADE DAS FILHAS

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Índice de Fertilidade/Rep. % | 1.7 |
| Taxa Prenhez Filhas/Rep. % | 1.7/90 |
| Taxa de Conceção das Novilhas/Rep. % | 1.1/92 |
| Taxa de Conceção das Vacas/Rep. % | 2.3/90 |

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS

| | |
|--------------------------------|---------|
| F. P. Touro/Rep. % | 1.7/98 |
| F. P. Filha/Rep. % | 2.0/91 |
| Gestation Length/Rep. % | -0.1/98 |
| Idade ao Primeiro Parto/Rep. % | 1.3/80 |
| Nados Mortos Touro/Rep. % | 4.7/96 |
| Nados Mortos Filhas/Rep. % | 4.6/88 |
| Vida Produtiva/Rep. % | 2.9/89 |
| Longevidade/Rep. % | 2.2/76 |
| Desperdício Alimentar/Rep. % | 103/27 |
| CCS/Rep. % | 3.13/96 |
| Vel. Ordenha/Rep. % | 102/80 |

FERTILIDADE DO TOURO

SCR/Rep. %

PRODUÇÃO

| | |
|--------------------|---------|
| Leite | 239 |
| Proteína | 14 |
| Proteína (%) | 0.02 |
| Gordura | 20 |
| Gordura (%) | 0.04 |
| Produção Rep. % | 98 |
| Filhas/Explorações | 752/244 |

TIPO

| | |
|-----------------------|---------|
| Tipo | 1.62 |
| Úbere | 1.69 |
| Composto Pernas e Pés | 1.60 |
| Composto Corporal | -0.27 |
| Composto Leiteiro | -0.29 |
| Tipo Rep. % | 97 |
| Filhas/Explorações | 348/106 |

CDCB/HA TYPE TRAITS

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------|----------------|
| Estatura | pequena | 1.33 | grande |
| Robustez | estreita | -0.28 | robusta |
| Profundidade Corporal | pouco profunda | 0.02 | profunda |
| Carácter Leiteiro | carnuda | 0.44 | angulosa |
| Largura da Garupa | estreita | -1.02 | larga |
| Inclinaçã da Bacia | isquiones elevados | -0.41 | inclinado |
| Membros Post (v lateral) | rectos | 0.60 | curvos |
| Vista traseira das patas | tortas | 1.47 | direito |
| Angulo de Pé | talão fraco | 1.37 | talão profundo |
| Resultado de pés e pernas | baixo | 1.89 | alto |
| Inserção do Úbere Anterior | cutada | 2.37 | bem inserida |
| Inserção Posterior do Úbere | baixa | 2.80 | alta |
| Largura do Úbere Posterior | estreita | 0.61 | larga |
| Ligamento Suspensor | s/ligamento | 0.54 | bem definido |
| Profundidade do Úbere | profunda | 2.61 | pouco profunda |
| Colocação Tetos Anteriores | abertos | 1.51 | juntos |
| Colocação Tetos Posteriores | abertos | 1.58 | juntos |
| Comprimento dos Tetos | curtos | -1.49 | longos |

CARACTERÍSTICAS DE

ZOETIS

SAÚDE

CDCB

| | Value | Rep. % | | Value | Rep. % |
|--|-------|--------|-----------------------------|-------|--------|
| | 103 | 61 | Mastite | 1.6 | 80 |
| | 100 | 64 | Retenção de Placenta | -0.1 | 75 |
| | 103 | 63 | Metrite | 1.6 | 73 |
| | 101 | 51 | Hypocalcemia/Milk Fever | 0.2 | 65 |
| | 105 | 60 | Cetose | 2.4 | 69 |
| | 96 | 58 | Torção do Abomaso | 0.3 | 72 |
| | 96 | 59 | Laminite | | |
| | 99 | 56 | Doença Respiratória da Vaca | | |
| | 98 | 52 | Aborto de vaca | | |
| | 103 | 61 | Twinning | | |
| | 98 | 44 | Ovário cístico | | |
| | N/A | N/A | Heifer Livability | 0.40 | 63 |
| | 95 | 84 | Calf Respiratory Disease | | |
| | 99 | 84 | Calf Scours | | |